

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION

ThickenUP[®]
Junior



1. Préparez le liquide.

Versez le liquide que vous souhaitez épaissir dans un biberon ou un shaker.



2. Ajoutez du ThickenUP Junior.

Suivez les instructions de préparation pour obtenir la bonne quantité de poudre. Utilisez la mesurette jointe.



3. Agitez / Remuez.

Consultez les instructions de préparation pour connaître la durée nécessaire pour remuer le produit.



4. Respectez le temps d'épaississement.

Laissez le liquide s'épaissir pendant 5 minutes. Secouez encore une fois avant utilisation et vérifiez la consistance.



LIQUIDE/ BOISSON	TEMPÉRATURE	1 TRÈS LÉGÈREMENT ÉPAIS 1x	2 LÉGÈREMENT ÉPAIS 2x	3 MODÉRÈMENT ÉPAIS 3x	4 TRÈS ÉPAIS 5x	AGITER/ REMUER
 Eau / Eau avec sirop	20-22°C	100 ml	100 ml	100 ml	100 ml	30 sec
 Nutrition médicale (lait en poudre)	24 - 37°C	90 ml	100-120 ml	100-120 ml	-	120 sec
 Lait de vache	15-24°C	80-90 ml	100 ml	90-100 ml	100 ml	120 sec
 Jus d'orange / Jus de pomme	15-24°C	90 ml	125 ml	100 ml	90 ml	120 sec
 Thé	24 - 37°C	100 ml	100-150 ml	100-150 ml	100-150 ml	30 sec

1 mesurette rase = 2,5 g.

Si vous épaississez un liquide avec ThickenUP Junior pour la première fois, il est recommandé d'effectuer d'abord un test IDDSI.

Par exemple, les résultats obtenus avec l'eau du robinet peuvent varier selon les régions. Il est de la responsabilité de la personne qui administre ThickenUP Junior de s'assurer qu'elle prépare correctement la préparation de ThickenUP Junior.

ThickenUP Junior est un épaississant à utiliser en cas de reflux et/ou de difficultés de déglutition.

Alimentation à usage médical à partir de 6 mois.
À utiliser sous contrôle médical.

Nestlé Health Science, Rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles
Tél. : 02 529 52 30 • www.NestleHealthScience.be

Pour plus d'informations, notamment des instructions de préparation détaillées et vidéos, veuillez consulter le site www.ThickenUPJunior.com ou consultez votre professionnel de la santé.



Nestlé
HealthScience